

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください—

使用上の注意改訂のお知らせ

処方箋医薬品

合成セファロスポリン製剤

セファメジン[®]α筋注用0.25g **セファメジン[®]α筋注用0.5g**
セファメジン[®]α注射用0.25g **セファメジン[®]α注射用0.5g**
セファメジン[®]α注射用1g **セファメジン[®]α注射用2g**
セファメジン[®]α点滴用キット1g **セファメジン[®]α点滴用キット2g**

注意—医師等の処方箋により使用すること

2020年9月

LTL ファーマ株式会社

このたび、標記製品につきまして、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知薬生安発 0908 第2号（令和2年9月8日）に基づき、【効能又は効果に関連する使用上の注意】の一部を改訂いたしましたので、お知らせいたします。

今後のご使用に際しましては、改訂後の添付文書をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容】

改訂後（下線部改訂）	改訂前
<p>〈効能又は効果に関連する使用上の注意〉 咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、<u>中耳炎</u>、<u>副鼻腔炎</u>への使用にあたっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」¹⁾を参照し、抗微生物薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。</p>	<p>〈効能又は効果に関連する使用上の注意〉 咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、副鼻腔炎への使用にあたっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」¹⁾を参照し、抗微生物薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。</p>

【改訂理由】

厚生労働省健康局結核感染症課編：抗微生物薬適正使用の手引きに基づき、改訂した。

今後とも当社製品のご使用にあたって副作用等の有害事象をご経験の際には、当社 MR まで、できるだけ速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.292 (2020年9月発行予定)」に掲載されます。PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」(<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>) に最新 添付文書並びに DSU が掲載されます。流通在庫の都合により、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには日数を要しますので、今後のご使用に際しましては、ここにご案内します改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

問い合わせ先：

LTL ファーマ株式会社 コールセンター
フリーダイヤル 0 1 2 0 - 3 0 3 - 7 1 1
製造販売元

LTL ファーマ株式会社
東京都新宿区西新宿 6-10-1

CMX01hjA
2020年9月作成