

# ガスター<sup>®</sup>錠/ガスター<sup>®</sup>D錠についてのご案内




薬価基準収載

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

H<sub>2</sub>受容体拮抗剤 日本薬局方 ファモチジン錠

**ガスター<sup>®</sup>錠**  
**10mg/20mg**  
Gaster<sup>®</sup> Tablets 10mg・20mg



薬価基準収載

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

H<sub>2</sub>受容体拮抗剤 (ファモチジン口腔内崩壊錠)

**ガスター<sup>®</sup>D錠**  
**10mg/20mg**  
Gaster<sup>®</sup>D Tablets 10mg・20mg

「効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む注意事項等情報」については電子添文を参照ください

ガスター<sup>®</sup>錠/ガスター<sup>®</sup>D錠は令和8年度薬価改定で後発医薬品と同薬価となりました。  
これにより、後発医薬品の数量シェア(置換え率)を計算する式に含まなくなりました。  
また選定療養の対象外となります。  
今後とも引きつづき臨床の場でお役立ていただければ幸いです。

※薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和8年4月1日適用)厚生労働省

※長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について(令和8年3月5日事務連絡)厚生労働省

※ファモチジン錠・ファモチジン口腔内崩壊錠は一般名処方マスタから削除されました

処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(令和8年4月1日適用)厚生労働省

## 製品名印字

ガスター<sup>®</sup>錠/ガスター<sup>®</sup>D錠は視認性を高めるために製品名を印字しております。



LTLファーマ株式会社

## 包装規格一覧

包装規格	新包装薬価(単位円)	統一商品コード	GS1 (販売包装単位)
ガスター®D錠10mg×100錠(PTP)	1,080	919100334	(01)14987919100331
ガスター®D錠10mg×500錠(PTP)	5,400	919100358	(01)14987919100355
ガスター®D錠10mg×500錠(瓶、バラ)	5,400	919100365	(01)14987919100362
ガスター®D錠20mg×100錠(PTP)	1,080	919100396	(01)14987919100393
ガスター®D錠20mg×500錠(PTP)	5,400	919100419	(01)14987919100416
ガスター®D錠20mg×500錠(瓶、バラ)	5,400	919100426	(01)14987919100423
ガスター®錠10mg×100錠(PTP)	1,080	919100501	(01)14987919100508
ガスター®錠10mg×500錠(PTP)	5,400	919100518	(01)14987919100515
ガスター®錠20mg×100錠(PTP)	1,080	919100563	(01)14987919100560
ガスター®錠20mg×500錠(PTP)	5,400	919100570	(01)14987919100577
ガスター®錠20mg×1,000錠(PTP)	10,800	919100532	(01)14987919100539

## 患者さん説明用資材

**ガスター®錠10mg・20mgを服用される方へ**

- ガスター®錠はファモチジンを主成分とするお薬です。
- ガスター®錠は胃粘膜のヒスタミンH<sub>2</sub>受容体を遮断し、胃酸分泌をおさえるお薬です。
- 喉や食道に錠剤がひっかかってしまわないように、コップ1杯程度の水とともに飲みましょう。

LTLファーマ株式会社



**ガスター®D錠10mg・20mgを服用される方へ**

- ガスター®D錠はファモチジンとファモチジンDを主成分とするお薬です。
- ガスター®D錠は胃粘膜のヒスタミンH<sub>2</sub>受容体を遮断し、胃酸分泌をおさえるお薬です。
- 口の中で崩れます。少量の水で飲み込んでください。また、水を使わずに飲む場合は寝たままの状態では飲まないようにしてください。

GSX61020-0A LTLファーマ株式会社



**ガスター®を服用される方へ**

**ガスター®錠 (製品名印字製品)**

10mg 20mg

喉や食道に錠剤がひっかかってしまわないように、コップ1杯程度の水とともに飲みましょう。

**ガスター®D錠 (製品名印字製品)**

10mg 20mg

口の中で崩れます。少量の水で飲み込んでください。また、水を使わずに飲む場合は寝たままの状態では飲まないようにしてください。

**ガスター®散**

2g 10g

何かに混ぜて飲む場合は医師、薬剤師に確認してください。



製品概要



チャットボット

患者様向け資材のご要望はコールセンターまでご連絡ください



LTLファーマ株式会社

【医療関係者向けホームページ】 <https://www.ltl-pharma.com/product/>

文献請求先及び問い合わせ先

LTLファーマ株式会社コールセンター 0120-303-711  
受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・会社休日を除く)

2026年3月作成  
GSX7101nrA