患者向医薬品ガイド

2025年6月更新

エミレース錠3mg
エミレース錠10mg

【この薬は？】

販売名	エミレース錠3mg Emilace Tablets 3mg	エミレース錠10mg Emilace Tablets 10mg
一般名	ネモナプリド Nemonapride	
含有量	ネモナプリド3mg（1錠中）	ネモナプリド10mg（1錠中）

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

・この薬は、精神神経用剤と呼ばれるグループに属する薬です。
・この薬は、脳内の神経伝達物質の受容体に作用してそのバランスを整えます。
・次の病気の人に処方されます。
統合失調症
・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

〇次の人は、この薬を使用することはできません。

・昏睡状態の人、またはバルビツール酸誘導体などの中枢神経抑制剤の強い影響下にある人

・パーキンソン病またはレビー小体型認知症の人

〇次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

・心臓や血管の病気のある人、低血圧の人、またはこれらが疑われている人

・てんかんなどのけいれんをおこす病気のある人、または過去にてんかんなどのけいれんがあった人

・脱水の人や栄養状態が悪い人

・長期間動かないでじっとしている人、長期間病床にある人、肥満の人、脱水状態の人

・肝臓に障害のある人

・妊婦または妊娠している可能性のある人

・授乳中の人

〇この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの年齢や症状などにあわせて、医師が決めます。
通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

エミレース錠 3mg 及び 10 mgを組み合わせて飲むことがあります。

販売名	エミレース錠 3mg	エミレース錠 10mg
1 日量	9mg～36mg	
飲む回数	1 日量を数回に分けて飲みます	

1 日 60mg まで増量することができます

・この薬は食後に飲んでください。

●どのように飲むか？

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。
気がついた時に、1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の時間に 1 回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

・眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下がおこることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
・授乳している人は医師に相談してください。
・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。
このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
悪性症候群 (Syndrome malin) あくせいしょうこうぐん (シンドローム　マリン)	高熱、汗をかく、ぼーっとする、手足のふるえ、体のこわばり、話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、脈が速くなる、呼吸数が増える、血圧が上昇する
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
白血球減少 はっけっきゅうげんしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる
肺塞栓症 はいそくせんしょう	胸の痛み、突然の息切れ
深部静脈血栓症 しんぶじょうみゃくけっせんしょう	皮膚が青紫～暗紫色になる、下肢のはれ、下肢のむくみ、下肢の痛み、下肢（もしくは、はれた部分）の熱感

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	高熱、突然の高熱、寒気、汗をかく、体のこわばり、疲れやすい、体がだるい、力が入らない、食欲不振、体がかゆくなる
頭部	ぼーっとする
眼	白目が黄色くなる
口や喉	話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、喉の痛み、吐き気
胸部	呼吸数が増える、胸の痛み、突然の息切れ

部位	自覚症状
手・足	手足のふるえ、脈が速くなる、下肢のはれ、下肢のむくみ、下肢の痛み、下肢（もしくは、晴れた部分）の熱感
皮膚	皮膚が黄色くなる、皮膚が青紫～暗紫色になる
尿	尿の色が濃くなる
その他	血圧が上昇する

【この薬の形は？】

販売名	エミレース錠 3mg	エミレース錠 10mg
PTP シート		
形状	糖衣錠 	糖衣錠
直径	6.7mm	8.8mm
厚さ	3.4mm	4.5mm
重さ	0.14g	0.28g
色	白色	白色
識別コード	LT011	LT010

【この薬に含まれているのは？】

販売名	エミレース錠 3mg	エミレース錠 10mg
有効成分	ネモナプリド	
添加剤	ヒプロメロースフタル酸エステル、無水リン酸水素カルシウム、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、 ステアリン酸カルシウム、白糖、乳酸カルシウム水和物、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、タルク、酸化チタン、カルナウバロウ	

【その他】

●この薬の保管方法は？

・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

・絶対に他の人に渡してはいけません。

・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：LTL ファーマ株式会社
(https://www.ltl-pharma.com/)
LTL ファーマコールセンター
電話番号：0120-303-711
受付時間：9 時～17 時 30 分
（土、日、祝日、会社休日を除く）