

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下がおこることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。




重大な副作用	主な自覚症状
悪性症候群 (Syndrome malin) あくせいしょうこうぐん (シンドローム マリン)	高熱、汗をかく、体のこわばり、ぼーっとする、話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、呼吸数が増える、手足のふるえ、脈が速くなる、血圧が上昇する
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
白血球減少 はっけつきゅうげんしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	体がかゆくなる、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる
肺塞栓症 はいそくせんしょう	胸の痛み、突然の息切れ
深部静脈血栓症 しんぶじょうみやくけっせんしょう	発熱、唇が青紫色になる、手足の爪が青紫～暗紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛み、皮膚が青紫～暗紫色になる

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発熱、高熱、突然の高熱、寒気、汗をかく、体のこわばり、疲れやすい、体がだるい、力が入らない、体がかゆくなる
頭部	ぼーっとする
眼	白目が黄色くなる
口や喉	話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、喉の痛み、吐き気、唇が青紫色になる

部位	自覚症状
胸部	呼吸数が増える、胸の痛み、突然の息切れ
腹部	食欲不振
手・足	手足のふるえ、脈が速くなる、手足の爪が青紫～暗紫色になる、 下肢のむくみ、下肢の痛み
皮膚	皮膚が黄色くなる、皮膚が青紫～暗紫色になる
尿	尿の色が濃くなる
その他	血圧が上昇する

【この薬の形は？】

販売名	エミレース錠 3mg	エミレース錠 10mg
PTP シート		
形状	糖衣錠	糖衣錠 
直径	6.7mm	8.8mm
厚さ	3.4mm	4.5mm
重さ	0.14g	0.28g
色	白色	白色
識別コード	LT011	LT010

【この薬に含まれているのは？】

販売名	エミレース錠 3mg	エミレース錠 10mg
有効成分	ネモナプリド	
添加物	ヒプロメロースフタル酸エステル、無水リン酸水素カルシウム、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸カルシウム、白糖、乳酸カルシウム水和物、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、タルク、酸化チタン、カルナウバロウ	

